

Des « trous » dans la couverture vaccinale française

Dans l'ensemble de l'Europe, la couverture vaccinale a fortement progressé, mais reste largement en dessous des recommandations de l'OMS.

Rougeole

En France, la couverture vaccinale de la rougeole à 2 ans progresse lentement depuis le début des années 1990 (75 % en 1992 à 86,3 % en 2003).

La couverture s'améliore avec l'âge (95 % à 10 ans en 2002), ce qui montre une vaccination tardive des enfants par rapport au calendrier vaccinal.

Ces chiffres globaux masquent d'importantes disparités régionales, les écarts entre départements allant de 66 à 97 % en 2003 pour les enfants de 2 ans. Globalement, la couverture vaccinale est moins bonne dans les départements du sud que du nord.

L'Institut de veille sanitaire (InVS) rappelle que la France risque de voir réapparaître des épidémies de rougeole. Ce fut le cas fin 2003 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont la couverture vaccinale est insuffisante. La Suisse (464 cas en 2003, 3 encéphalites) et l'Italie (40 000 cas en 2002, 12 encéphalites et 3 décès en Campanie) ont déjà connu cette situation.

Rubéole

Pour la rubéole, la couverture vaccinale en France était de 84,2 % à l'âge de 2 ans et 94 % à l'âge de 6 ans en 2001.

Une enquête nationale menée en 1998 a montré que 10 % des jeunes femmes de 15 à 19 ans étaient séronégatives vis-à-vis de la rubéole (non protégées par des anticorps).

Oreillons

Concernant les oreillons, l'épidémie qui a sévi en Angleterre début 2005 et qui a touché les adolescents et les jeunes adultes, montre que nous ne sommes pas à l'abri d'une résurgence de cette maladie. ▀



Rougeole
Oreillons
Rubéole

N'attendez pas que ça devienne plus méchant

Vaccinez votre enfant dès 1 an

L'Assurance Maladie

Ce qu'il faut retenir

- Il faut vacciner individuellement et en collectivité le plus tôt possible pour protéger l'enfant et favoriser l'éradication des trois maladies.
- De 5 à 10% d'enfants restent non protégés (mauvaise réponse immunitaire) après la 1^{re} injection, d'où une 2^e de rattrapage : la protection approche alors 100 %.
- Réactions au ROR ? Complications des maladies plus graves que les réactions, peu fréquentes : locales (érythème, douleur, œdème) ou générales (nausée, vomissement, diarrhée).
- Si un enfant a déjà eu une des trois maladies ? Aucun risque à refaire le ROR.
- Contre-indications : maladie immunodépressive, traitements immunosuppresseurs, corticoïde, gammaglobulines, radiothérapie, hypersensibilité au vaccin, allergie à néomycine/kanamycine, fièvre, BCG de moins d'un mois, traitement, transfusion de moins de 3 mois, grossesse (la vaccination pendant la grossesse ne justifie pas l'IVG). VIH : le ROR est le seul vaccin possible chez un séropositif.
- ROR recommandé : il n'est pas obligatoire, peu de vaccins le sont. Considérant que chacun est libre de choisir, les vaccins récents sont seulement recommandés.

Source : Assurance Maladie